



# 健のう丸

KENNOGAN

便秘薬<生薬薬劑>

指定第二類醫藥品

全部採用植物性成分製成的藥丸型便秘薬。

1天1次，睡前服用，隔天（一般為8～12小時後）即可得到自然、舒暢的排便。

MADE IN JAPAN

## 功用

減緩便秘及伴隨便秘而來的下列症狀：

腦袋昏沉、頭臉發熱、肌膚粗糙、痤瘡、食慾不振、腹部腫脹、腸內異常發酵、痔瘡

## 用法、用量

請1天1次，於睡前服用下述劑量。

不過，便秘的症狀因人而異，所以初次服用請以最少量，並視排便的情況和狀態，一點點增量或減量。

	15歲以上	11歲以上未滿15歲	7歲以上未滿11歲
當2～3天沒有排便時	6～9粒	4～6粒	3～4粒
當4天以上沒有排便時	9～12粒	6～8粒	4～6粒

## 用法、用量相關的注意事項

- (1) 請嚴格遵守用法、用量。
- (2) 兒童服用時，請在保護者的指導、監督之下進行。

## 成分、分量（12粒中）與作用

成分	分量	作用
大黃粉	640mg	促進大腸正常運動。
蘆薈粉	160mg	
番瀉苷鈣	24mg	

作為添加物，含有阿拉伯膠、糊精、聚乙二醇。

## 成分、分量相關的注意事項

- (1) 服用本藥劑，可能會導致尿液呈現黃褐色或紅褐色，這是因有效成分番瀉苷所導致，並非異常現象。
- (2) 由於本藥劑採用天然原料，產品的色調和光澤可能多少會有點差異，但效果並無二致。

## 使用注意事項

### 禁止事項

(如不遵守容易使現在的症狀惡化或引發副作用)

1. 服用本藥劑期間，請勿同時服用以下醫藥品。  
其他的瀉下藥（瀉藥）
2. 哺乳中的人請勿服用本藥劑，或在服用本藥劑時避免哺乳。
3. 請勿大量服用。

## 諮詢事項

1. 以下情形者，請於使用前諮詢醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。

- (1) 正在接受醫師治療的人
- (2) 懷孕或疑似懷孕的人
- (3) 曾因藥物等引起過敏症狀的人
- (4) 有以下症狀的人

劇烈腹痛、噁心、嘔吐

2. 服用後出現下列症狀時，可能是藥品的副作用，請立即停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹子、發紅、搔癢
消化系統	劇烈腹痛、噁心、嘔吐

3. 服用後可能會出現下列症狀，當感覺這類症狀持續或加劇時請停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

4. 服用約 1 週症狀仍未好轉時請停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。