

キズカイン

KIZU KAIN



消毒抗菌藥劑

第二類醫藥品

添加 2 種止癢成分與防止化膿的成分，滲透傷口、治療讓人搔癢的創傷。採用塗抹也不易滲透的油性基底藥劑，不含類固醇。肌膚乾燥所造成的傷口
蟲咬後的傷，搔抓衣服鬆緊帶勒住部位引起的抓傷 等等

MADE IN JAPAN

功用

割傷、擦傷、抓傷、磨破腳、皮膚的殺菌與消毒

用法、用量

請 1 天數次適量地塗抹在患部。

用法、用量相關的注意事項

- (1) 請嚴格遵守規定用法、用量。
- (2) 請勿在手上沾有軟膏時，觸碰眼睛或嘴巴周圍等。
- (3) 兒童使用時，請在保護者的指導、監督之下進行。
- (4) 請注意不要接觸眼睛。萬一進入眼睛時，請迅速以清水或溫水沖洗。另外，當症狀嚴重時，請接受眼科醫生的診療。
- (5) 請僅用於外部。
- (6) 請勿在患部及其周圍髒污的狀態下使用。

成分、分量（100g 中）與作用

成分	含量	作用
西曲溴鉍	0.5g	藉由殺菌消毒作用，防止化膿。
利多卡因	2.0g	藉由局部麻醉作用，迅速舒緩傷口的搔癢和疼痛。
苯海拉明	0.5g	藉由抗組胺劑作用，控制傷口的搔癢。

作為添加物，含有微晶蠟、甘油硬脂酸、失水山梨醇三油酸酯、凡士林。

使用注意事項

諮詢事項

1. 以下情形者，請於使用前諮詢醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。
 - (1) 正在接受醫師治療的人
 - (2) 曾因藥物等引起過敏反應的人
 - (3) 患部範圍較廣的人
 - (4) 傷口較深或嚴重燒燙傷的人
2. 使用後出現下列症狀時，可能是藥品的副作用，請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹子、發紅、搔癢、腫脹

3. 使用約 5 ~ 6 天症狀仍未好轉時請停止使用, 並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。