



コウナキッズ

KOUNAKIZZU

口内潰瘍及喉嚨痛用藥

第三類醫藥品

鎮痛並抑制口腔內炎症的噴霧。
適合兒童的葡萄味。

MADE IN JAPAN

功用

因口腔潰瘍、喉嚨炎症所導致的喉嚨痛、喉嚨乾癢、喉嚨腫脹、喉嚨不適、聲音沙啞

用法、用量

請 1 天數次適量地噴塗在患部。另外，初次使用時，請按壓數次直至藥液噴出。

用法、用量相關的注意事項

- (1) 一邊吸氣一邊使用，可能會導致藥液進入支氣管或肺部，因此要用於喉嚨深處時，請一邊發出聲音一邊噴灑藥液。
- (2) 使用時，噴嘴請勿觸碰到口腔。
- (3) 請嚴格遵守用法、用量。
- (4) 兒童使用時，請在保護者的指導、監督之下進行。
- (5) 請注意不要接觸眼睛。萬一進入眼睛時，請迅速以清水或溫水沖洗。另外，當症狀嚴重時，請接受眼科醫生的診療。

成分、分量（100g 中）與作用

| 成分 | 含量 | 作用 |
|---------|-------|--------------------------|
| 萘磺酸鈉水合物 | 0.02g | 直接作用於黏膜並抑制炎症，改善疼痛、腫脹等症狀。 |

作為添加物，含有甘油、乙二胺四乙酸二鈉、D-山梨糖醇、糖精鈉、磷酸二氫鈉、碳酸氫鈉、氯化十六烷基吡啶水合物、乙氧基化氫化蓖麻油、乙醇、香料。

使用注意事項

諮詢事項

1. 以下情形者，請於使用前諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人
 - (2) 曾因藥物等引起過敏症狀的人
 - (3) 口腔內部糜爛嚴重的人
2. 出現下列症狀時，請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

| 關聯部位 | 症狀 |
|------|-----------|
| 口腔 | 刺激感 |
| 皮膚 | 起疹子、發紅、搔癢 |

3. 使用約 5 ~ 6 天症狀仍未好轉時。

2019/3