



# 新今治水®

NEW KONJISUI

牙痛藥劑

第二類醫藥品

直接塗抹於牙痛處，迅速鎮痛的藥水型牙痛藥。

MADE IN JAPAN


## 功用

舒緩蛀牙、牙齦炎、牙根的疼痛。

## 用法、用量

請將吸飽藥劑的棉球，壓進蛀牙的牙洞裡。

上方瓶蓋內放有棉花。請以乾淨的手指取出適當大小的棉球使用。



使用附贈的小夾子，讓棉球吸收適量的新今治水。



較大的牙洞疼痛時，請將吸飽新今治水的棉球塞進蛀牙的牙洞裡。

較小的牙洞疼痛時，請用吸飽新今治水的棉球，塗抹牙齒的表面。

## 用法、用量相關的注意事項

- (1) 請遵守規定用法。
- (2) 請勿塗抹於會疼痛的牙洞之外的部位。
- (3) 兒童使用時，請在保護者的指導、監督之下進行。
- (4) 本藥劑為牙科專用，請勿用於眼科或其他病症。
- (5) 本藥劑不會損害牙齒的硬齒質（琺瑯質、象牙質），若剩餘藥劑沾附於牙齒之外的部位時，可能會暫時讓味覺等產生變化，請用紗布等擦拭去除。
- (6) 不小心沾到臉上或嘴巴周邊等時，請立即用清水仔細清洗並擦拭。

※本藥劑無法治療蛀牙等牙痛的成因，建議盡早尋求牙科醫師接受根本的治療。

## 成分、分量（100g 中）與作用

成分	含量	作用
丁香油	0.3g	緩和疼痛。
苯酚	5.0g	鎮痛、殺菌。
dL-樟腦	10.0g	緩和疼痛。
桂皮油	2.5g	
l-薄荷醇	0.1g	
鹽酸苯海拉明	2.0g	控制炎症。

鹽酸待布卡因	0.1g	緩和疼痛。
鹽酸對氨基苯甲酸 二乙氨基乙酯	0.03g	
山梔子酊劑	15.07g	控制炎症。

作為添加物，含有丙二醇、乙醇。

## 使用注意事項

### 禁止事項

(如不遵守容易使現在的症狀惡化或引發副作用)

請勿用於以下部位。

牙齦、嘴唇

### 諮詢事項

- 以下情形者，請於使用前諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。
  - 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
  - 曾因藥物等引起過敏症狀的人。
- 使用後出現下列症狀時，可能是藥品的副作用，請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹子、發紅、搔癢

- 使用約 5 ~ 6 次症狀仍未好轉時請停止使用，並持本說明書諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。醫藥買賣人員。。